

Натурсидин, 30 мл

Состав: экстракт плодов черники (25% антоцианов), плоды расторопши пятнистой, экстракт семян грейпфрута, гриб шиитаке, загуститель глицерин (E422), кордицепс, корень эхинацеи экстракт листьев и шелухи черного грецкого ореха, экстракт горечавки желтой, эфирное масло орегано, эфирное масло лаванды, эфирное масло гальбанум, сок свеклы, порошок сока моринды лимонистая, порошок луковиц чеснока, кора белой ивы, спирт (картофель или тростник) (0,0349мкг/2,5 мл).

Предназначение	Рекомендации по применению
В качестве биологически активной добавки к пище – источника полифенольных соединений, антоцианов	Взрослым от 2 капель до 1 чайной ложки в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
Для профилактики респираторных инфекций, вызванных бактериями и вирусами, которые могут приводить к образованию биоплёнок на слизистых оболочках у детей и взрослых	Взрослым от 2 капель до 1 чайной ложки в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. Детям после консультации со специалистом по 2 капли 2-3 раза в день.
Реабилитация после инфекционных заболеваний бактериальной и вирусной природы, в период реконвалесценции	Взрослым от 2 капель до 1 чайной ложки в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. Детям после консультации со специалистом по 2 капли 2-3 раза в день.
Для снижения активности хронического воспаления слизистых оболочек верхних дыхательных путей	Взрослым от 2 капель до 1 чайной ложки в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. Детям после консультации со специалистом по 2 капли 2-3 раза в день.
В комплексном лечении воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта	Взрослым от 2 капель до 1 чайной ложки в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.



Натурсидин, 30 мл

Для повышения работоспособности и для профилактики преждевременного старения	Взрослым от 2 капель до 1 чайной ложки в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
В комплексных схемах профилактики атеросклероза, гипертонии и инфаркта миокарда	Взрослым от 2 капель до 1 чайной ложки в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.

